



Instructions suite à un curetage de la gencive

Afin de prévenir tout malaise ou inconfort suite à un curetage, nous vous suggérons de suivre les conseils suivants:

- 1 - Pendant les 48 premières heures, prenez des analgésiques (Advil, Tylenol, Ibuprofène, Acétaminophène) pour diminuer la sensibilité.
- 2 - Vos dents peuvent devenir sensibles au froid. Cette sensibilité peut durer jusqu'à deux mois. Si c'est le cas, utiliser une pâte à dent pour dents sensibles (Sensodyne, Pro Relief...). Évitez les aliments trop froids durant cette période. Si la sensibilité persiste plus longtemps, revenez nous consulter.
- 3 - Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif pour les maladies de gencives (Parodontite). Les traitements que nous dispensons visent à prévenir la progression de la maladie.
- 4 - Pour contrôler la maladie, il est essentiel de faire détartrer et nettoyer vos dents **à tous les trois mois**.
- 5 - Il est primordial d'avoir une hygiène dentaire minutieuse quotidienne (brosse à dents, soie dentaire, brossettes interdentaires, etc.).

Ensemble, il nous sera possible de maintenir vos gencives en santé, d'arrêter la progression de la maladie et de **sauver vos dents**.

Pour plus d'information: visitez ledentiste.com + entrer le mot de passe: 1966