



Précautions suite à une chirurgie dentaire

INSTRUCTIONS

1. Mordre sur le coton et le remplacer à toutes les 20 minutes jusqu'à ce que le saignement cesse. Si vous manquez de coton, utilisez un sac de thé. Il est normal d'avoir la salive colorée pendant les deux premiers jours.
2. Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits par le dentiste
3. Si on ne vous a pas prescrit de médicaments, prenez des analgésiques tels Advil et Tylenol en cas de douleur.
4. Pendant les premières 48 heures, vous ne devez pas vous rincer la bouche, fumer ni manger des aliments qui sont trop durs, trop chauds ou trop épicés.
5. Si vous avez eu des points de suture, appliquez de la glace sur la joue pendant 20 minutes, cessez pendant 10 minutes, puis recommencez. Faites cela seulement la première journée. Les points de suture sont fondants et disparaîtront.
6. Si vous éprouvez un problème quelconque, communiquez avec votre dentiste traitant ou avec le dentiste de garde de notre service d'urgence 24 heures.

NOTE: Afin de prévenir une perte rapide et substantielle d'os et/ou de faciliter la pose d'un implant dans le futur, nous recommandons le placement d'une greffe osseuse au moment de l'extraction.