



Instructions spéciales suite à la pose d'implants

Le but des implants est de remplacer des dents manquantes ou de redonner de la stabilité aux prothèses.

Les 2 premières semaines sont cruciales au succès des implants. Tout traumatisme peut mener à l'échec. Il est préférable de ne pas porter de prothèse sur les implants durant cette période. Si cela n'est pas possible, il faut consommer une nourriture molle et enlever la prothèse le plus souvent possible. (Ne pas la porter durant la nuit.)

Il ne faut pas fumer, manger des aliments trop chauds, froids, durs ou épicés durant les 4 premiers jours suivant la pose de l'implant. Éviter de toucher à votre plaie. Après cette période, vous pourrez rincer votre bouche 3 à 4 fois par jour avec de l'eau salée (1/4 de cuillère à thé de sel pour 4 onces d'eau tiède) pendant une minute.

Prenez votre médication telle que prescrite, cela vous évitera bien des problèmes.

Nous contrôlerons votre implant dans deux à quatre semaines, seulement si le dentiste traitant le juge nécessaire. Ensuite, il faudra attendre 4 à 6 mois avant de confectionner la prothèse ou le pont.

Malgré toutes les précautions prises, un pourcentage des traitements de pose d'implant échoue (entre 5 et 20 %). À la clinique, grâce à notre haut taux de succès, nous remplacerons les implants dont la pose s'est avérée un échec ou nous rembourserons le coût du traitement, et ce, pour une période de 3 ans après la pose initiale de l'implant.

NOTRE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS:

Nous vous rappelons que votre implant est garanti pour 3 ans par votre dentiste traitant qui en est le seul responsable.

Pour plus d'information: visitez ledentiste.com + entrer le mot de passe: 1966