



## Précautions suite à une obturation

Afin de prévenir tout malaise ou inconfort suite à une obturation, nous vous suggérons de suivre les conseils suivants:

1. Faire attention aux aliments chauds ou froids pour une ou deux semaines. Il est normal d'avoir une sensibilité accrue au froid et au chaud qui peut durer jusqu'à 8 semaines.
2. Ne pas mordre des choses qui sont trop dures et essayer de manger de l'autre côté de la bouche durant les premières 24 heures.
3. Pour obturer votre dent, il nous a fallu creuser une cavité; ceci irrite la dent et il en résulte de l'inflammation. Pour diminuer l'inflammation et le malaise qui en résulte lorsque vous "dégelez" prenez des anti-inflammatoires tels Aspirine ou Advil.
4. Si vous sentez un malaise lorsque vous mordez sur votre dent c'est peut-être que le plombage n'est pas à la bonne hauteur. Il vous suffit de revenir pour un petit ajustement.
5. Si la douleur persiste après 8 semaines, ou s'intensifie au lieu de diminuer, rappelez nous.
6. Si vous avez reçu une anesthésie pour les dents du bas, prenez garde de ne pas vous mordre la joue ou la langue.

### **NOTRE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS:**

Nous vous rappelons que votre restauration est garantie pour 3 ans par votre dentiste traitant qui en est le seul responsable.

Pour plus d'information: visitez [ledentiste.com](http://ledentiste.com) + entrer le mot de passe: 1966