



Précautions suite à un traitement de canal

Nous avons anesthésié votre dent afin de compléter le traitement d'aujourd'hui sans que vous éprouviez de sensibilité. Lorsque la dent "dégèlera", il se peut qu'il y ait une très légère enflure et de la sensibilité. Dans certains cas, il se peut qu'il y ait beaucoup de douleur; c'est pourquoi je vous ai prescrit un médicament très puissant.

Afin de réduire toute possibilité de sensibilité, veuillez suivre les conseils suivants:

- 1- Si vous avez reçu une prescription d'ANTIBIOTIQUES, veuillez la terminer complètement pour s'assurer que l'infection est entièrement éliminée.
- 2- Essayez de mâcher de l'autre côté de la bouche pour les deux prochaines semaines. Votre dent peut demeurer douloureuse pendant une dizaine de jours et par la suite, elle peut être sensible à la pression jusqu'à 8 semaines.
- 3- Si vous éprouvez de la douleur intense, prenez les médicaments qui ont été prescrits à cet effet.
- 4- Toute dent ayant subi un traitement de canal devient plus fragile et cassante et peut se fracturer; **c'est pourquoi il est important que votre dent reçoive une couronne afin d'en prévenir la fracture et la perte éventuelle.**

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

NOTRE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS:

Nous vous rappelons que votre traitement de canal est garantie pour 3 ans par votre dentiste traitant qui en est le seul responsable..

Pour plus d'information: visitez ledentiste.com + entrer le mot de passe: 1966